



# RECOMMENDED REALSTRONG FERTILIZER APPLICATION FOR MANGO PLANTS.

Cadangan penaburan baja realstrong untuk tanaman mangga.



PERINGKAT / STAGES	USIA POKOK / TREE AGE	TYPES OF FERTILISER & USAGE RATE / JENIS BAJA & KADAR PENGGUNAAN	REMARKS/CATATAN
Early stage / Peringkat awal	0	<b>SOIL CONDITIONER</b> (1KG/POKOK) or/atau <b>K-NEUTRALIZER</b> (5KG/POKOK) (campur dengan tanah)	Place the fertilizer in the plant hole or incorporate it into the soil using a plow.  Masukkan baja ke dalam lubang tanaman atau bajak ke dalam tanah.
Vegetative growth / Pertumbuhan vegetatif	1 TAHUN / 1 YEAR	<b>MAX GROWTH</b> (1KG OR 2KG/POKOK) or/atau <b>SOIL CONDITIONER</b> (1KG OR 2KG/POKOK) or/atau <b>K-NEUTRALIZER</b> (5KG/POKOK)	Apply the fertilizer 3-4 times a year. For K-Neutralizer, spread the fertilizer on the surface around the base of the tree.  Taburkan baja sebanyak 3-4 kali setahun. Untuk K-Neutralizer, taburkan baja di permukaan pokok pada pangkal pokok.
	2 TAHUN / 2 YEARS		
	3 TAHUN / 3 YEARS		
Fruit yield / Penghasilan buah	4TAHUN / 4 YEARS	<b>SOIL CONDITIONER</b> (4KG/POKOK) or/atau <b>MAX GROWTH</b> (2KG/POKOK)	Apply the fertilizer four times a year. Taburkan baja sebanyak 4 kali setahun.
	5 TAHUN / 5 YEARS	<b>SOIL CONDITIONER</b> (5KG/POKOK) or/atau <b>MAX GROWTH</b> (2.5KG/POKOK)	
	6 TAHUN / 6 YEARS	<b>MAX GROWTH</b> (3KG/POKOK) or/atau <b>MAX K</b> (2.5KG/POKOK)	
	7 TAHUN / 7 YEARS	<b>MAX GROWTH</b> (4KG/POKOK) or/atau <b>MAX K</b> (3KG/POKOK)	
	8 TAHUN KE ATAS / 8 YEARS AND ABOVE		

Peringatan: Jangan menabur baja ketika musim pembungaan. Baja hanya boleh ditabur 2 minggu setelah itu.

