



CADANGAN PENABURAN BAJA **REALSTRONG** UNTUK TANAMAN RAMBUTAN (RECOMMENDED **REALSTRONG** FERTILIZER SPREAD FOR RAMBUTAN PLANTS)

USIA POKOK / TREE AGE	JENIS BAJA & KADAR PENGGUNAAN / TYPES OF FERTILIZER & USAGE RATE	KEKERAPAN (TAHUN) / FREQUENCY (YEARS)	CATATAN / REMARKS
1 TAHUN / 1 YEAR	SOIL CONDITIONER (1.5KG/POKOK) AND / DAN MAX GROWTH (0.5KG/POKOK)	3 KALI / 3 TIMES	<p>1. Taburkan baja disekitar pokok pada hujung kanopi. (Spread fertilizer around the tree at the edge of the canopy.)</p> <p>2. Bagi mengawal penyakit KULAT, semburkan larutan TRICHO ACTI-PLUS (500ML/POKOK) sekali/setahun. (To control fungal disease, spray TRICHO ACTI-PLUS solution (500ML per tree) once a year.)</p>
2 TAHUN / 2 YEAR	MAX GROWTH (1KG/POKOK)	3-4 KALI / 3-4 TIMES	
3 TAHUN / 3 YEAR	MAX GROWTH (1.5KG/POKOK)		
4 TAHUN / 4 YEAR	MAX K (1.5KG/POKOK) OR / ATAU MAX GROWTH (2KG/POKOK)	3 KALI / 3 TIMES	
5 TAHUN / 5 YEAR	MAX K (2KG/POKOK) OR / ATAU MAX GROWTH (2.5KG/POKOK)		
6 TAHUN / 6 YEAR	MAX K (2.5KG/POKOK) OR / ATAU MAX GROWTH (3KG/POKOK)		
7 TAHUN / 7 YEAR	MAX K (3.5KG/POKOK) OR / ATAU MAX GROWTH (4KG/POKOK)		
8 TAHUN / 8 YEAR	MAX K (4.5KG/POKOK) OR / ATAU MAX GROWTH (5KG/POKOK)		
8 TAHUN KE ATAS / 8 YEARS AND ABOVE	MAX K (5KG/POKOK) OR / ATAU MAX GROWTH (5KG/POKOK)		

